

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP -2-5-66 501410

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 67 d'Avril 1966

1966-13

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Black-Rot : A chaque pluie, les projections d'ascospores se poursuivent et peuvent donc permettre des contaminations sur la nouvelle végétation à partir des grappes desséchées de l'an dernier.

Dans les foyers de 1965 et près des vignes incultes, renouveler le traitement précédent qui a été délavé.

Acarie : Les éclosions d'araignées rouges (*P. ulmi*) sont en cours. Nous conseillons pour les parcelles dans lesquelles des pullulations de larves et de nymphes sont actuellement observées sur les jeunes feuilles d'appliquer un traitement à partir du 25 avril. Ce traitement est inutile dans les autres parcelles.

La montée des adultes d'araignées jaunes (*Eotetranychus carpini*) sur le feuillage est commencée. Mais il est encore prématuré d'envisager un traitement contre cette espèce. Un Bulletin ultérieur en fixera l'époque favorable.

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Les premières taches viennent d'apparaître sur les Pommiers, les invasions se poursuivent et deviennent importantes sur les Poiriers.

Avec les pluies abondantes et prolongées de ces derniers jours qui délavent les produits, des contaminations peuvent se produire par les Périthèces non encore vidées de leurs ascospores, mais aussi par les conidies formées sur les taches.

Il importe donc de continuer la protection en appliquant un nouveau traitement dès à présent.

Acarie : Les éclosions massives de *Panonychus ulmi* (araignée rouge) se généralisent dans toutes les zones fruitières, à l'exception des vergers de l'embouchure de l'Adour où elles sont encore relativement faibles.

Les traitements doivent être entrepris dès à présent dans la région de Pau et dans les vergers du Lot et Garonne. Dans les autres régions on pourra attendre le début de la semaine prochaine.

INFORMATIONS

Hoplocampe des Pommiers : Dans les vergers ordinairement attaqués par l'Hoplocampe des Pommiers, prévoir, au fur et à mesure de la défloraison des variétés, un traitement avec une spécialité à base d'H.C.H., de Lindane ou de Parathion.

Bordeaux, le 21 Avril 1966

Le Contrôleur chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant: L. BOUYX

P 200